

Treats up to **20,000 Square Feet**



# COMPLETE BRAND INSECT KILLER


For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

**2-WAY FORMULA**<sup>†</sup>

PROTECTS YOUR LAWN FROM TOP TO BOTTOM

**Kills Surface Insects\***

**Kills Soil Insects\***  
for up to **3 Months**



\*listed insects

† Contains both contact and systemic insecticide.

Active Ingredients:  
Imidacloprid ..... 0.15%  
β-Cyfluthrin ..... 0.05%  
Other Ingredients ... 99.80%  
Total 100.00%

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**CAUTION** See back panel for additional  
precautionary statements

Not for sale, sale into, distribution and or use in Nassau, Suffolk,  
Kings, and Queens counties of New York.



**FÓRMULA DE 2 VÍAS**  
**Mata insectos\* de superficie**  
**Mata insectos de suelo\* hasta por 3 meses**

Treats up to  
**20,000 Sq Ft**  
NET WT 20 Lb (9 kg)



## COMPLETE BRAND INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

**Kills Surface Insects\***

**Kills Soil Insects\***  
for up to **3 Months**

**COMPLETE BRAND INSECT KILLER**  
For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

**Kills Surface Insects\***  
for up to **3 Months**

**COMPLETE BRAND INSECT KILLER**  
For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

**Kills Surface Insects\***  
for up to **3 Months**

**Kills Soil Insects\***  
for up to **3 Months**



# COMPLETE BRAND INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

This product contains Bayer's proprietary 2-way action formula\*. Bayer Advanced's 2-way action controls turf pests like ants, fleas, and ticks plus soil pests like grubs in one easy step. It not only kills existing listed soil pests, but also keeps on protecting for up to 90 days. Keeping the yard, lawn, and around your home free of listed nuisance pests has never been easier.

## READ THE LABEL FIRST!

### QUICK FACTS

- Kills Listed Insects Above & Below Ground
- Long-Lasting - Up To 90-Day Subsurface Insect Protection

<b>KILLS</b>	Ants, Fleas, Ticks, White Grubs, Chinch Bugs, Mole Crickets, European crane fly larvae and other listed pests
<b>COVERAGE</b>	Covers up to 20,000 sq. ft. for ants, fleas, and ticks. Covers up to 10,000 sq. ft. for all other listed pests.
<b>WHERE TO USE</b>	Lawn, Ground Covers, Flower Beds, Around Trees & Shrubs, and Around Homes
<b>WHEN TO USE</b>	<b>Surface Pests:</b> Whenever insects are present <b>White Grubs:</b> May through July <b>European crane fly larvae:</b> Apply once, when adult insects are present in large numbers
<b>HOW MUCH TO USE</b>	See directions
	For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG, (1-877-229-3724) or visit our website at <a href="http://www.bayeradvanced.com">www.bayeradvanced.com</a>



### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Before use, read and follow all label directions.

### FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

#### BEFORE YOU USE Read and follow these directions when using:

- Restrictions:**
- Do not apply near fish pools, ponds, streams or lakes.
  - Food utensils such as teaspoons and measuring cups should not be used for food purposes after use with this insecticide.
  - Keep people and pets away from treated area until it has been watered and allowed to dry.
  - Do not use in vegetable gardens.
  - Do not allow people or pets to reenter until sprays have dried.
  - Do not apply this product, by any application method, to linden, basswood, or other Tilia species.

#### HOW TO USE

##### HOME PERIMETER TREATMENT

##### PESTS

Ants, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Digger Wasps, Earwigs, Millipedes, Pillbugs, Scorpions, Sowbugs, Spiders, Termites\*

##### HOW MUCH TO APPLY

1/6 to 1/2 cup per 45 to 50 ft. (2 to 3 ft. band) 1 to 3 lbs. per 1000 sq. ft. - ants, Apply 2-3 lbs per 1,000 sq. ft. - all other listed pests  
Covers up to 20,000 sq. ft. (a band 2 feet wide and 10,000 feet long.) If pest pressure is higher, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft.

##### HOW TO APPLY

**Around the Exterior Perimeter of the House** To keep these pests away from your home, apply granules in a band 2 to 3 feet wide around and up to the structure. Water in thoroughly after applying. To prevent pest damage, apply this product early - when pests are still young and easier to kill.

**TIP: A hand-held spreader makes this easy.** For Ant Mounds or Wasp Burrows Sprinkle 1 to 2 teaspoons of granules over the ant mound or wasp burrow. Treat wasps at night, after they are back in their nest. Water in thoroughly after applying.

##### TO CONTROL LISTED PESTS IN AND AROUND THE LAWN

##### PESTS

Annual Bluegrass weevil (hyperodes weevil), Ants, Armyworms, Billbugs, Black Turfgrass Atanienus, Chiggers, Chinch Bugs, Cutworms, European crane fly larvae, Fleas, Grasshoppers, Leafhoppers, Mealybugs, Mole Crickets, Mosquitoes, Sod Webworms (lawn moths), Ticks (including deer ticks), White Grubs (including larvae of Asiatic Garden Beetle, Black Turfgrass Atanienus, Chafers, Japanese Beetle, May or June Beetle, and Oriental Beetle)

##### HOW MUCH TO APPLY

Apply 1 to 3 lbs per 1000 sq. ft. - ants, fleas, and ticks, Apply 2-3 lbs per 1,000 sq. ft. - all other listed pests Adjust your spreader to the proper setting. See the following table. This bag covers 20,000 sq. ft. which is the same as a lawn 100 feet wide and 200 feet long. If pest pressure is higher, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft. For control of European crane fly larvae apply 3 lbs per 1,000 sq. ft.

##### HOW TO APPLY

Use rotary or drop type spreaders to apply granules evenly over the lawn, flower beds, ground covers, and around trees/shrubs. To be sure you cover lawn areas uniformly, first treat the border of the lawn then fill in the center.

Make parallel passes, walking at a steady pace to ensure even distribution of the granules. Water thoroughly within a day after applying. To prevent pest damage, apply this product early - when pests are still young and easier to kill. **TIP:** For best control of white grubs, mole crickets, and European crane flies apply just before egg hatch. Contact your County Extension Agent for the ideal dates to apply in your area.

##### PESTS

Fire Ants

##### HOW MUCH TO APPLY

1/4 cup per mound

##### HOW TO APPLY

**Fire Ant Mounds** Sprinkle evenly over mound. Treat new mounds as they appear. Water in thoroughly after applying.

##### APPLICATION RESTRICTIONS

- Apply this product directly to the lawn or garden area. Water treated area as directed on this label. Do not water to the point of run-off.
- Do not make applications during rain.
- Do not mow until the granules are thoroughly watered in.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

\*contains both contact and systemic insecticides

† This product will kill workers and winged reproductive forms of termites that enter into the treated areas. Use of this type of product to kill termites should not be considered a substitute for soil treatment of subterranean termites done by a professional pest control operator.

Keep people and pets away from treated area until it has been watered and allowed to dry.

### IMPORTANT - Directions for Storage and Disposal

**PESTICIDE STORAGE** Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably in a locked storage cabinet.

**PESTICIDE DISPOSAL** If Empty: • Non-refillable container. Do not refill or reuse this container. • Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled: • Call your local solid waste agency or 1-877-229-3724 for disposal instructions. • Never place unused product down any outdoor or indoor drain.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin.
- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with skin, eyes or clothing.
- Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.
- Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

#### FIRST AID +

**IF SWALLOWED** • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.

**IF INHALED** • Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

**IF ON SKIN OR CLOTHING** • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

**IF IN EYES** • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

**NOTE:** When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel. You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information.

Active ingredient: 0.15% Imidacloprid [CAS # 138261-41-3] and 0.05% Beta-Cyfluthrin [CAS # 68359-37-5].

### ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is toxic to fish.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. • Apply this product only as specified on this label.

**NOTICE:** Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

**Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

#### SPREADER SETTINGS:

If your spreader is not listed, please call our Consumer Service Hotline toll free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) for help.

Rate: 1 to 3 lbs. per 1,000 sq. ft.

#### GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR:

Si su esparcidor no se encuentra en la lista, solicite ayuda llamando a nuestro número gratuito de servicio al consumidor: 1-877-BayerAG (1-877-229-3724).

Tasa: 1 a 3 libras (0,45 a 1,4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>).

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR					
Broadcast Spreaders Model Modelo de esparcidores al voleo	1 lb. Rate Setting Graduación de tasa de 1 libra (0,45 kg) <sup>†</sup>	2 lb. Rate Setting Graduación de tasa de 2 libras (0,9 kg) <sup>†</sup>	3 lb. Rate Setting Graduación de tasa de 3 libras (1,4 kg) <sup>†</sup>	Distance Between Passes (Ft.) Distancia entre las pasadas (pies)	
SCOTTS BASIC	3	4.25	5.25	9	
SCOTTS STANDARD	3	4	4.5	10	
SCOTTS DELUXE EDGE GUARD	3	3.75	4.5	8	
VIGORO 10000	5	6.5	7	12	
VIGORO 15000	2	3	5	10	
Drop Spreaders Model Modelo de esparcidores por goteo	1 lb. Rate Setting Graduación de tasa de 1 libra (0,45 kg) <sup>†</sup>	2 lb. Rate Setting Graduación de tasa de 2 libras (0,9 kg) <sup>†</sup>	3 lb. Rate Setting Graduación de tasa de 3 libras (1,4 kg) <sup>†</sup>	Distance Between Passes (Ft.) Distancia entre las pasadas (pies)	
SCOTTS ACCUGREEN 1000	2	3.25	4.25	N/A	
SCOTTS ACCUGREEN 2000	2	3.25	4	N/A	
SCOTTS ACCUGREEN 3000	2	3.25	4.5	N/A	

\*Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.

TIP: 1000 sq. ft. = 20 ft. x 50 ft.

Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly.

\*Las graduaciones son aproximadas. El estado del esparcidor, la velocidad a la que se camina, y la irregularidad del terreno pueden afectar la tasa de aplicación. Debe calibrarse el esparcidor de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

**CONSEJO:** 1000 pies cuadrados = 20 pies x 50 pies (93 m<sup>2</sup> = 6,1 m x 15,2 m)

No usar un esparcidor que aplique los granulos en franjas demasiado angostas, concentradas o irregulares. Asegúrese de que el esparcidor funcione correctamente y esparza los granulos en forma pareja.

Produced for: Bayer Advanced, A Division of Bayer CropScience LP  
P.O. Box 12014, 21.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709

8-cyfluthrin is the chemical name for Tempo® Ultra Insecticide.  
imidacloprid is the chemical name for Merit® Insecticide.

† This product will kill workers and winged reproductive forms of termites that enter into the treated areas. Use of this type of product to kill termites should not be considered a substitute for soil treatment of subterranean termites done by a professional pest control operator.

## ¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

### DATOS RÁPIDOS

- Extermina los insectos que figuran en la lista sobre y debajo del suelo.
- Protección subterránea contra insectos duradera hasta 90 días.

<b>MATA</b>	Hormigas, pulgas, garrapatas, larvas blancas, chinches de los cereales, grillos topos, larvas de la tipula paludosa y otras plagas que figuran en la lista.
<b>COBERTURA</b>	Cubre hasta 20.000 pies cuadrados (alrededor de 1800 m <sup>2</sup> ) para hormigas, pulgas y garrapatas. Cubre hasta 10.000 pies cuadrados (alrededor de 900 m <sup>2</sup> ) para todas las demás plagas.
<b>DÓNDE USAR</b>	Céspedes, recubrimientos del suelo, maceteros de flores, alrededor de árboles y arbustos, y alrededor de casas.
<b>CUÁNDO USAR</b>	<b>Plagas de superficie:</b> En donde haya insectos. <b>Larvas blancas:</b> Desde mayo hasta julio. <b>Larva de la tipula paludosa:</b> Aplicar una vez, cuando los insectos adultos estén presentes en grandes cantidades.
<b>CUÁNTO USAR</b>	Ver las indicaciones
	Para preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en línea en <a href="http://www.BayerAdvanced.com">www.BayerAdvanced.com</a>

### INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Antes de utilizar, lea y siga las indicaciones de la etiqueta.

### PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES SOLAMENTE.

#### ANTES DE USAR Lea y siga las indicaciones cuando use el producto.

- Restricciones**
- No aplicar cerca de estanques de peces, lagunas, arroyos o lagos.
  - Los utensilios de uso diario, tales como cucharas y tazas medidoras, no deben usarse con fines domésticos después de haberlos usado con este insecticida.
  - Mantenga a las personas y mascotas fuera del área tratada hasta que el producto se haya diluido y secado.
  - No usar en jardines con vegetales.
  - No deje que las personas y las mascotas vuelvan a entrar hasta que el rociado se haya secado.
  - No aplicar este producto, mediante ningún método de aplicación, sobre tilo, tilo americano u otra especie de Tilia.

#### CÓMO USAR

##### TRATAMIENTO PERIMETRAL DEL HOGAR

##### PLAGAS

Hormigas, ciempiés, cucarachas, grillos, avispa excavadora, tijeretas, milpiés, cochinillas escorpiones, arañas, termitas†.

##### CUÁNTO APLICAR

1/6 a 1/2 taza por 45 a 50 pies (13-15 m) (una franja de 2 a 3 pies - 0,60 a 0,90 m)

1 a 3 libras (0,45 a 1,4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>) para hormigas: Aplicar 2-3 libras (0,9 - 1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>) para todas las otras plagas que figuran en el listado. Cubre hasta 20.000 pies cuadrados (1800 m<sup>2</sup>) (una franja de 2 pies de ancho (0,60 m) a 10.000 pies de largo (900 m<sup>2</sup>)). Si hay gran cantidad de plagas, aplique proporciones de 3 libras por 1.000 pies cuadrados.

##### CÓMO APLICAR

**Alrededor del perímetro exterior de la casa:** Para ahuyentar a las plagas de su casa, aplique granulos en una franja de 2 a 3 pies (0,60 a 0,90 m) de ancho en los alrededores y hasta la estructura. Regar completamente después de la aplicación. Para evitar el daño de plagas, aplique este producto temprano, cuando las plagas son jóvenes y fáciles de exterminar.

**CONSEJO:** Un esparcidor manual facilitará la tarea.

**Para hormigueros y nidos de avispa:** Esparza 1 o 2 cucharadas de granulos sobre los hormigueros y nidos. Aplique a las avispa en la noche, una vez que hayan vuelto a sus nidos. Regar completamente después de la aplicación.

##### PARA CONTROLAR LAS PLAGAS DEL LISTADO EN CÉSPEDES Y SUS ALREDEDORES

##### PLAGAS

Gorgojos de pasto azul (Género hyperodes), hormigas, gusanos soldados, cochinillas, ataniens de césped negro, ácaros, chinches, gusanos cortadores, larva de la tipula paludosa, pulgas, grillos, saltahojas, cocos, grillos topo, mosquitos, palomillas (polilla del césped), garrapatas (incluido las garrapatas del ciervo), gorgojos blancos (incluido las larvas del escarabajo asiático del jardín, escarabajos, escarabajos japoneses, escarabajos de mayo o junio, y escarabajos orientales).

##### CUÁNTO APLICAR

Aplique 1 a 3 libras (0,45 a 1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>) para hormigas, pulgas y garrapatas. Aplique de 2 a 3 libras (0,9 - 1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93m<sup>2</sup>) para todas las otras plagas que figuran en el listado. Ajustar el esparcidor al modo apropiado. Ver la siguiente tabla. Esta bolsa cubre 20.000 pies cuadrados (1800 m<sup>2</sup>) lo que equivale a un césped de 100 pies (30,48 m) de ancho y 200 (60,96) pies de largo.

Si hay gran cantidad de plagas, aplique proporciones de 3 libras por 1.000 pies cuadrados.

Para el control de la larva de la tipula paludosa, aplique 3 libras (1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>).

##### CÓMO APLICAR

Use un esparcidor de gata o rotativo para aplicar los granulos en forma pareja en céspedes, maceteros, revestimiento de suelos, y alrededor de árboles y arbustos.

Para asegurarse de que cubre toda el área del césped de manera uniforme, primero aplique en los bordes y luego llene el centro.

Pase en forma paralela, caminando con paso regular para asegurarse de distribuir bien los granulos.

Riegue bien el mismo día de la aplicación. Para evitar el daño de plagas, aplique este producto temprano, cuando las plagas son jóvenes y fáciles de exterminar.

**CONSEJO:** Para un mejor control de los gorgojos blancos, grillos topo, y tipulas paludosas, realizar la aplicación antes de que incuben sus huevos.

Comuníquese con el Agente de extensión local de su condado para saber cuáles son las fechas ideales para aplicar este insecticida en su área.

##### PLAGAS

Hormigas rojas

##### CUÁNTO APLICAR

1/4 taza por hormiguero.

##### CÓMO APLICAR

**Hormigueros de hormigas rojas:** Esparza en forma pareja sobre el hormiguero. Trate los nuevos hormigueros en cuanto aparezcan. Regar copiosamente después de la aplicación.

##### RESTRICCIONES SOBRE LA APLICACIÓN

- Aplicar este producto directamente sobre el césped o el área del jardín.
- Regar el área tratada según lo indicado en la etiqueta.
- No regar hasta el punto de escurrimiento.
- No aplicar cuando llueve.
- No cortar el césped hasta que los granulos hayan sido regados.
- Se prohíbe la aplicación de este producto directamente en cloacas o alcantarillados, o cualquier otra área como canchales donde haya un desague a alcantarillados, boxes de tormenta, cursos de agua o hábitat acuático. No permitir que el producto ingrese a un desague durante o después de la aplicación.

\*contiene insecticida de contacto y sistémico

† Este producto exterminará termitas obreras y reproductoras aladas que ingresen al área tratada. El uso de este tipo de producto para exterminar termitas no debe considerarse un sustituto para el tratamiento del suelo de las termitas subterráneas realizado por un profesional de control de plagas.

Mantenga a las personas y mascotas fuera del área tratada hasta que se haya regado y secado el lugar.

### IMPORTANTE - Indicaciones para almacenamiento y eliminación

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA** Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete bajo llave.

**ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA** Si está vacío: • Contenedor no reusable. No llenar ni volver a utilizar este contenedor.

• Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

Si está parcialmente lleno: • Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para obtener indicaciones para la eliminación. • Nunca desheche el producto sin usar en una alcantarilla interna o externa.

### DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

#### PRECAUCIÓN Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

- Perjudicial si se ingiere o absorbe por la piel.
- Causa leve irritación en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavar bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar goma de mascar, consumir tabaco, o ir a los sanitarios.
- Sacar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.

#### PRIMEROS AUXILIOS +

**SI SE INGIERE** • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de control de envenenamiento. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

**SI SE INHALA** • Mover a la persona a un lugar fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a la ambulancia, luego realice respiración artificial, preferentemente por boca, de ser posible. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para asesoramiento sobre el tratamiento a seguir.

**EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA** • Sacar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. • Llamar a un médico o centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

**EN CONTACTO CON LOS OJOS** • Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos. • Retirar las lentes de contacto, si tuviera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un médico o al centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

**NOTA:** Cuando llame a un centro de control de envenenamiento, tenga la etiqueta a su alcance. Si requiere de tratamiento en una sala de emergencia o en el consultorio de su médico, lleve la etiqueta del producto con usted para mostrarle al personal médico. Puede llamar al número gratuito 1-877-229-3763 para obtener información de emergencia médica.

Ingredientes activos: 0,15% Imidacloprida (CAS N° 138261-41-3), y 0,05% Beta cyfluthina (CAS N° 68359-37-5).

#### RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando el clima está cálido y no hay

probabilidad de lluvia para las próximas 24 horas garantizará que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Si se realiza el barrido del producto que se acumula en entradas de auto, veredas, o calles hacia el área tratada del césped o jardín ayudará a evitar